

ПУТЬ БИНТА



Повязка на голеностоп



Повязка на палец



Повязка на кисть



5 см - для пальцев кистей и стоп

7 см - для кисти, стопы, лучезапястного и голеностопного сустава

10 см - для головы, верхних конечностей, голени

14 см - для грудной клетки, живота, бедер




Бинтование всегда начинается с узкой части тела и лишь затем
переходит на широкую


Текст: Алексей Водовозов. Художник: Андрей Грищенко




Повязка на плечевой сустав




Повязка на грудь




Повязка на живот



Каждым последующим туром бинта нужно прикрывать от половины
до двух третей предыдущего




а



б

Рис. 3. Повязка на голову в виде «чепца».






Повязка варежка




а




б




ВИДЫ ПОВЯЗОК




а



б



б




в






а





б




Виды и техника наложения повязок





Артериальное кровотечение и первая помощь



Жгут надо накладывать выше места ранения и затягивать с такой силой, чтобы сдавить стенки сосуда. Под жгут следует подкладывать мягкую ткань, чтобы не повредить нервы.

Жгут накладывается **не более чем на 2 ч**, так как возможно омертвение тканей.

При направлении пострадавшего в больницу к жгуту прикрепляют записку с указанием точного времени наложения жгута.

Наложение жгута при артериальном кровотечении



Прижать пальцем артерию выше кровотечения


На расстоянии 3-5 см выше раны вокруг конечности
наложить любую чистую и мягкую материю

Растянуть жгут двумя руками в средней части. Плотно приложить жгут
к конечности. Сделать оборот вокруг конечности, затем второй, третий и т.д.

Прикрепить к жгуту записку с указанием точного времени (часы и минуты)
и даты наложения

Доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медучреждение

Искусственное дыхание «Рот в нос»



1. Рот пострадавшего закрыт.
2. Плотно обхватите губами нос и дуйте.
3. Откройте ему рот для выдоха.
4. Продолжайте эту процедуру.



Первая помощь при венозном кровотечении

1. Наложить на рану давящую асептическую повязку, если повязка не помогает, необходимо наложить жгут или закрутку ниже раны;
2. Жгут или закрутку можно держать не более 1,5-2 часов летом и 50 мин. – 1 час зимой;
3. прикрепить записку с указанием времени наложения жгута;
4. Отправить пострадавшего в больницу

