

Математика

(профильный уровень)

задание 13

2024

Попова Елена Юрьевна,
учитель математики
МАОУ СОШ № 5
города Тюмени

Задание 13

Тип задания по кодификатору требований

Уравнение или система уравнений

Характеристика заданий

Относительно несложное уравнение или система уравнений с отбором корней. Может содержать тригонометрические функции, логарифмы, степени, корни



Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году в Тюменской области


Год	Номер задания в КИМ	показатель баллов	Процент выполнения задания в Тюменской области				
			средний	в группе не преодолевших минимальный балл	в группе от минимального до 60 т.б.	в группе от 61 до 80 т.б.	в группе от 81 до 100 т.б.
2023	12	средний	41,2	0,00	7,4	79,9	94,4
		2 балла	38,6	0,00	5,5	76,3	92,7
		1 балл	5,2	0,00	3,9	7,2	3,2
2022	12.	средний	41,9	0,0	6,5	77,4	98,5
		2 балла	39	0,00	4,8	73,6	97,8
		1 балл	5,8	0,00	4,1	7,6	1,5
2021	13.	средний	31,8	0,0	4,0	62,9	97,3
		2 балла	28,57	0,00	1,95	57,04	95,86
		1 балл	6,46	0,00	4,04	11,63	2,87

По имеющимся данным можно видеть положительную динамику по сравнению с 2021 годом, как в среднем показателе, так и группам, кроме «высокобалльников».

В **2021** году было предложено распадающееся тригонометрическое уравнение. Глобальной ошибкой было деление на переменную без дополнительных условий и не рассмотренных ситуаций, когда значение этой переменной обращается в ноль.

В **2022** году было тригонометрическое уравнение, сводящееся к квадратному, при использовании свойства чётности тригонометрической функции косинуса и формулы двойного угла, это и объясняет столь высокие показатели как в группах, так и в целом.

В **2023** году применялись следствия из формулы «основное тригонометрическое тождество», ну и так сказать завуалированное распадающееся уравнение. И основные ошибки заключались в незнании/ не умении пользоваться данными фактами.



Типы уравнений

Целые рациональные уравнения


Дробно-рациональные уравнения

Иррациональные уравнения

Тригонометрические уравнения

Логарифмические уравнения

Показательные уравнения



Главным этапом решения любого уравнения является сведение его к одному или нескольким простейшим уравнениям

Целые рациональные уравнения



**Линейные уравнения
Квадратные уравнения**

Дробно-рациональные уравнения



Уравнения вида $\frac{f(x)}{g(x)}$

Иррациональные уравнения



Уравнения вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$

Главным этапом решения любого уравнения является сведение его к одному или нескольким простейшим уравнениям

Тригонометрические уравнения



Уравнения вида $\sin x = a$,
 $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, где $a \in \mathbb{R}$

Показательные уравнения



Уравнения вида $a^{f(x)} = b$

Логарифмические уравнения



Уравнения вида $\log_a f(x) = b$

Тригонометрические уравнения

С определенной степенью условности можно отнести к одному из двух основных типов:

- 1. уравнения, сводимые к простейшим с помощью тех или иных тригонометрических преобразований** (понижения степени, преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, введения вспомогательного угла и др.);
- 2. уравнения, вначале сводимые к алгебраическим** с помощью той или иной замены переменной, а затем с помощью обратной замены приводимые к одному или нескольким простейшим.



12

а) Решите уравнение

$$2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos x + 1.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2} \right]$.

Справочные материалы

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x + 1 - 2 \sin^2 x = \sqrt{3} \cos x + 1; \sin x - 2 \sin^2 x = 0;$$
$$\sin x \cdot (2 \sin x - 1) = 0.$$

Значит, $\sin x = 0$, откуда $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.


б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Получим числа: -3π ; -2π ; $-\frac{11\pi}{6}$.

Ответ: а) πk , $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$\text{б) } -3\pi; -2\pi; -\frac{11\pi}{6}.$$




Содержание критерия	Балл
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а) ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а) и пункта б)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13 (источник: основная волна ЕГЭ-2023, Москва)

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$



а) Воспользуемся формулой $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$

$$\sin x(2 \cos^2 x - 1) - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$$


$$2 \cos^2 x \sin x - \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$

$$\cos^2 x(2 \sin x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б) С помощью тригонометрической окружности отберём корни.




Таким образом, подходят корни

$$\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4}$$

Задание 13 (источник: основная волна ЕГЭ-2023, Дальний Восток)

а) Решите уравнение $2 \sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 2 \sin x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$



а) Преобразуем уравнение:

$$2 \sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 2 \sin x$$

$$2 \sin x (\sin^2 x - 1) + \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$


$$-2 \sin x \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$

$$\cos^2 x (-2 \sin x + \sqrt{2}) = 0$$

Отсюда получаем

$$\begin{cases} \cos x = 0; \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k; \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \end{cases} \text{ где } k \in \mathbb{Z}$$

б) С помощью тригонометрической окружности отберём корни.



Таким образом, подходят корни $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}$.

Ответ:

а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}$

Задание 13 (источник: досрочная волна в ЕГЭ-2023)

а) Решите уравнение $\log_{13} (\cos 2x - 9\sqrt{2} \cos x - 8) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.



а) Имеем

$$\log_{13} 1 = 0$$

Тогда уравнение равносильно

$$\cos 2x - 9\sqrt{2} \cos x - 8 = 13^0$$

Аргумент логарифма равен 1, то есть положительному числу. Следовательно, ограничение «аргумент логарифма должен быть положительный» выполнено. Преобразуем это уравнение, воспользовавшись формулой косинуса двойного угла:

$$2 \cos^2 x - 9\sqrt{2} \cos x - 10 = 0$$

$$t = \cos x.$$

$$2t^2 - 9\sqrt{2}t - 10 = 0$$

$$D = 162 + 4 \cdot 2 \cdot 10 = 242$$

$$t = \frac{9\sqrt{2} \pm 11\sqrt{2}}{4}$$


$$t = -\frac{\sqrt{2}}{2}; 5\sqrt{2}$$

Сделаем обратную замену. Заметим, что

$$\cos x \neq 5\sqrt{2},$$

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

б) Отберем корни, с помощью тригонометрической окружности



Следовательно, на отрезке $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$ лежат корни

$$x = -\frac{5\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}$$

Ответ:

а) $\pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{5\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}$

Задание 13 (источник: досрочная волна в ЕГЭ-2023)

а) Решите уравнение $\log_4 (2^{2x} - \sqrt{3} \cos x - \sin 2x) = x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$



а) Данное уравнение равносильно

$$2^{2x} - \sqrt{3} \cos x - \sin 2x = 4^x$$

Заметим, что в этом случае аргумент логарифма равен положительному числу, то есть выполнено условие уравнения. Преобразуем полученное уравнение, заметив, $2^{2x} = 4^x$.

$$\sqrt{3} \cos x + 2 \sin x \cos x = 0$$

$$\cos x(2 \sin x + \sqrt{3}) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \cos x = 0 \end{array} \right.$$


$$\left[\begin{array}{l} \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

б) Отберем корни, с помощью тригонометрической окружности



Задание 13 (источник резервная волна в ЕГЭ-2023, Москва)

а) Решите уравнение $\log_3 x \cdot \log_3 (4x^2 - 1) = \log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 2; \log_5 27]$



а) Так как брать логарифм можно только у положительного числа, то имеем:

$$\begin{cases} x > 0 \\ 4x^2 - 1 > 0 \\ \frac{x(4x^2 - 1)}{3} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 4x^2 > 1 \end{cases} \Rightarrow x > \frac{1}{2}.$$

Преобразуем правую часть уравнения:

$$\log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3} = \log_3 x + \log_3 (4x^2 - 1) - 1$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned} \log_3 x \cdot \log_3 (4x^2 - 1) &= \log_3 x + \log_3 (4x^2 - 1) - 1 \\ \log_3 x (\log_3 (4x^2 - 1) - 1) &= \log_3 (4x^2 - 1) - 1 \\ (\log_3 x - 1) (\log_3 (4x^2 - 1) - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Тогда имеем:

$$\begin{cases} \begin{cases} \log_3 x - 1 = 0 \\ \log_3 (4x^2 - 1) - 1 = 0 \end{cases} \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} \log_3 x = 1 \\ \log_3 (4x^2 - 1) = 1 \end{cases} \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 3 \\ 4x^2 - 1 = 3 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 3 \\ x^2 = 1 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \\ x = -1 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Значит, $x = 3$ или $x = 1$.

б) x может принимать два значения. Давайте узнаем про каждое, принадлежит ли оно нужному отрезку.

1. $x = 1$.

$$1 = \log_5 5$$

$$\log_5 2 < \log_5 5 < \log_5 27$$

Значение $x = 1$ подходит.

2. $x = 3$.

$$3 = \log_5 125$$

$$\log_5 2 < \log_5 27 < \log_5 125$$

Значение $x = 3$ не подходит.

Тогда ответ: $x = 1$.

Ответ:


а) 1; 3

б) 1

Задание 13 (источник: резервная волна в ЕГЭ-2023, Дальний Восток)

а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) + 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi \right]$



а) Воспользуемся формулой синуса двойного угла и формулой приведения:

$$2 \sin x \cos x = \sin x - 2 \cos x + 1$$

$$2 \sin x \cos x - \sin x + 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\sin x(2 \cos x - 1) + (2 \cos x - 1) = 0$$

$$(\sin x + 1)(2 \cos x - 1) = 0$$


Тогда имеем совокупность

$$\begin{cases} \sin x + 1 = 0 \\ 2 \cos x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x = -1 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б) С помощью тригонометрической окружности отберём корни:



Ответ:


а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Задание 13 (источник: сборник И.В. Яценко, ЕГЭ-2024)

а) Решите уравнение $(4x^2 + 16x + 15) \left(\cos x \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - 0,5 \right) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2} \right]$.



а) По формуле приведения $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$. Следовательно, уравнение равносильно

$$\begin{cases} 4x^2 + 16x + 15 = 0 \\ -\frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} x = -\frac{5}{2} \\ x = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\sin 2x = -1$$

$$\begin{cases} x = -\frac{5}{2} \\ x = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) Отберем корни, с помощью тригонометрической окружности



Следовательно, на отрезке $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$ лежат числа $-\frac{5\pi}{4}; -\frac{5}{2}$.

Ответ:

а) $-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{5\pi}{4}; -\frac{5}{2}$

Задание 13 (источник: сборник И.В. Яценко, ЕГЭ-2024)

а) Решите уравнение $4^{x+\sqrt{x}-1,5} + 3 \cdot 4^{x-\sqrt{x}+1,5} - 4^{x+1} = 0$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[2; 6]$.



а) Сделаем замену $4^x = a$, $4^{\sqrt{x}-1,5} = b$. Тогда уравнение примет вид

$$ab + 3 \cdot \frac{a}{b} - 4a = 0 \mid \cdot \frac{b}{a} > 0 \Leftrightarrow b^2 - 4b + 3 = 0 \Leftrightarrow b = 1; 3$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 4^{\sqrt{x}-1,5} = 1 \\ 4^{\sqrt{x}-1,5} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} - 1,5 = 0 \\ \sqrt{x} - 1,5 = \log_4 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2,25 \\ x = \log_4^2 24 \end{cases}$$

б) $x = 2,25$ лежит в отрезке $[2; 6]$. Преобразуем $\log_4^2 24$. С одной стороны:

$$\log_4^2 24 = (1,5 + \log_4 3)^2 > (1,5 + 0,5)^2 = 4 > 2$$

С другой стороны:

$$\log_4^2 24 = \frac{1}{4} (2 + \log_2 6)^2 < \frac{1}{4} (2 + 2,75)^2 = \frac{361}{64} < 6$$

Следовательно, корень $x = \log_4^2 24$ также лежит в отрезке $[2; 6]$.

Ответ:

а) $2,25; \log_4^2 24$

б) $2,25; \log_4^2 24$

Задание 13 (источник: сборник И.В. Яценко, ЕГЭ-2024)

а) Решите уравнение $750^{\cos 3x} + 6 \cdot 125^{\frac{1}{3} + \cos 3x} = 5^{5 \cos 3x} + 30^{1 + \cos 3x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}\right]$



а) Разложим основания степеней на множители:

$$750 = 5^3 \cdot 6, \quad 125 = 5^3, \quad 30 = 5 \cdot 6$$

Сделаем замены

$$5^{\cos 3x} = a, \quad a \in \left[\frac{1}{5}; 5 \right]$$

$$6^{\cos 3x} = b, \quad b \in \left[\frac{1}{6}; 6 \right]$$

Тогда уравнение примет вид

$$\underline{a^3 b} + \underline{30a^3} = \underline{a^5} + \underline{30ab}$$

$$ab(a^2 - 30) - a^3(a^2 - 30) = 0$$

$$a(a^2 - 30)(b - a^2) = 0$$

$$\begin{cases} a = 0 \text{ — нет решений, так как } a \in \left[\frac{1}{5}; 5 \right] \\ a^2 = 30 \text{ — нет решений, так как } a \in \left[\frac{1}{5}; 5 \right] \\ a^2 = b \end{cases}$$

Обратная замена

$$25^{\cos 3x} = 6^{\cos 3x} \quad | : 6^{\cos 3x} > 0$$

$$\left(\frac{25}{6}\right)^{\cos 3x} = 1$$

$$\cos 3x = 0$$

$$3x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ответ:

а) $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{3\pi}{2}; -\frac{7\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}$

б) Отберем корни, с помощью тригонометрической окружности



$$-\frac{3\pi}{2}; -\frac{7\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}$$

а) Решите уравнение

$$\log_2^2(4x^2) + 3 \log_{0,5}(8x) = 1$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[0,15; 1,5]$.



а) Так как $\log_2^2(4x^2) = (\log_2(2x)^2)^2 = 4 \log_2^2(2x)$ и $\log_{0,5}(8x) = -\log_2(8x) = -(\log_2 4 + \log_2(2x))$, то после замены $t = \log_2(2x)$

$$\text{уравнение примет вид } 4t^2 - 3t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = -1; \frac{7}{4}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} \log_2(2x) = -1 \\ \log_2(2x) = \frac{7}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{1}{2} \\ 2x = 2^{\frac{7}{4}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ x = 2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{8} \end{cases}$$

б) Корень $x = \frac{1}{4}$ лежит в отрезке $[0, 15; 1, 5]$. Число $\sqrt[4]{8} > 1$. Сравним это число с $\frac{3}{2}$:

$$\sqrt[4]{8} \vee \frac{3}{2}$$

$$2\sqrt[4]{8} \vee 3$$

$$2^4 \cdot 8 \vee 3^4$$

$$128 \vee 81$$

Следовательно, $\sqrt[4]{8} > \frac{3}{2}$, значит, $x = \sqrt[4]{8}$ не лежит в отрезке $[0, 15; 1, 5]$.

Ответ:

а) $0, 25; \sqrt[4]{8}$

б) $0, 25$

Задание 13 (статград)

4. а) Решите уравнение $(\operatorname{tg}^2 x - 3) \sqrt{11 \cos x} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$.

Самое сложное здесь — область допустимых значений (ОДЗ). Условие $11 \cos x \geq 0$ заметно сразу. А условие $\cos x \neq 0$ появляется, поскольку в уравнении есть $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$.


ОДЗ:

$$\begin{cases} \cos x \geq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \cos x > 0.$$

Уравнение равносильно системе:


$$\begin{cases} \begin{cases} \operatorname{tg}^2 x - 3 = 0 \\ \cos x = 0 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg}^2 x - 3 = 0 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \\ \operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{3} + \pi n \\ \cos x > 0 \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

Отберем решения с помощью тригонометрического круга. Нам нужны те серии решений, для которых $\cos x > 0$, то есть те, что соответствуют точкам справа от оси Y .



Ответ в пункте а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

б) Отметим на тригонометрическом круге найденные серии решений и отрезок $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$.



Как обычно, ориентируемся на начало круга. Видим, что указанному промежутку принадлежат точки

$$x = \frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3} \text{ и } x = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{7\pi}{3}.$$

Диагностическая работа (статград 2020-2021)

13

а) Решите уравнение $\sin \frac{5x}{2} \sin \frac{3x}{2} + \cos \frac{5x}{2} \cos \frac{3x}{2} = 2 \cos^2 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Справочные материалы

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cdot \cos y - \cos x \cdot \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$$

Методы решения тригонометрических уравнений


Равносильные преобразования с применением формул

Замена, сведение к алгебраическому уравнению

Разложение на множители

Метод вспомогательного аргумента

Функциональный метод



Прежде чем приступить к решению заданий 13, нужно запомнить и научиться применять формулы записи решений простейших тригонометрических уравнений и далее овладеть методами решения основных типов тригонометрических уравнений.

$$\sin(x)=a, \cos(x)=a, \operatorname{tg}(x)=a, \operatorname{ctg}(x)=a$$

Вид уравнения	Общая формула серии решений
$\sin x = a, a \leq 1$	$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbf{Z}$
$\cos x = a, a \leq 1$	$x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$
$\operatorname{tg} x = a$	$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbf{Z}$
$\operatorname{ctg} x = a$	$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbf{Z}$

В случае отбора корней использование общей формулы серии решений для синуса и косинуса не всегда является удобной. При выполнении пункта б задания 13 удобнее не объединять серии решений, а наоборот - представлять их совокупностью.

Уравнения, непосредственно сводимые к простейшим

Наименее отдалены по уровню сложности от простейших тригонометрических уравнений уравнения вида

$$h(kx + b) = a \quad \text{и} \quad (h(x) - a)(g(x) - b) = 0,$$

где $h(x)$ и $g(x)$ — какие-то из четырех основных тригонометрических функций.

Вместо перехода от уравнения вида $\cos(f(x)) = m$ (где $|m| \leq 1$) к уравнению $f(x) = \pm \arccos m + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, бывает целесообразно перейти к совокупности

$$\begin{cases} f(x) = \arccos m + 2\pi k, \\ f(x) = -\arccos m + 2\pi n, \end{cases} \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$



Аналогичное замечание справедливо для уравнения вида $\sin(f(x)) = m$ (где $|m| \leq 1$). Соответствующая совокупность в этом случае имеет вид

$$\begin{cases} f(x) = \arcsin m + 2\pi k, \\ f(x) = \pi - \arcsin m + 2\pi n, \end{cases} \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

Уравнение $\operatorname{tg}(f(x)) = m$ равносильно уравнению $f(x) = \operatorname{arctg} m + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.



Преобразование суммы в произведение и обратное преобразование

При решении этого типа задач используются формулы преобразования суммы (разности) двух тригонометрических функций в произведение и формулы, позволяющие перейти от произведения двух тригонометрических функций к сумме (разности)

Решите уравнение $\sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0$.

Решение. Имеем

$$\sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = 0 \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{3x+5x}{2} \cdot \cos \frac{3x-5x}{2} + \sin 4x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin 4x \cdot \cos x + \sin 4x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin 4x (2 \cos x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin 4x = 0, \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$



Решите уравнение $\cos 3x + \sin 2x = 0$.

Решение. Поскольку

$$\sin 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right),$$

получаем, что


$$\cos 3x + \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \frac{\frac{\pi}{2} + x}{2} \cdot \cos \frac{5x - \frac{\pi}{2}}{2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) = 0, \\ \cos\left(\frac{5x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ \frac{5x}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{3\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$



Ответ: $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}, k \in \mathbb{Z}$.

Условия равенства двух одноименных тригонометрических функций

Уравнения указанного ниже вида могут быть решены как разложением на множители (с использованием формул суммы или разности синусов или косинусов), так и с использованием условий равенства двух одноименных тригонометрических функций различных аргументов.

Приведем соответствующие равносильные переходы:

$$\begin{aligned}\cos(f(x)) = \cos(g(x)) &\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + 2\pi n, \\ f(x) = -g(x) + 2\pi k, \end{cases} \\ \sin(f(x)) = \sin(g(x)) &\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + 2\pi n, \\ f(x) = \pi - g(x) + 2\pi k, \end{cases} \\ \operatorname{tg}(f(x)) = \operatorname{tg}(g(x)) &\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + \pi n, \\ f(x) \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \end{cases} \\ \operatorname{ctg}(f(x)) = \operatorname{ctg}(g(x)) &\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + \pi n, \\ f(x) \neq \pi k \end{cases} \end{aligned}$$

$$(k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}).$$

Уравнения вида $\sin(f(x)) = \cos(g(x))$ и $\operatorname{tg}(f(x)) = \operatorname{ctg}(g(x))$

с помощью формул приведения сводятся соответственно к уравнениям

$$\sin(f(x)) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - g(x)\right) \text{ и } \operatorname{tg}(f(x)) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - g(x)\right).$$

Условия равенства двух одноименных тригонометрических функций

Наиболее часто встречающаяся ошибка при решении уравнений этого типа — деление обеих частей уравнения на выражение, содержащее неизвестную (правильное действие — перенос всех членов в одну из частей уравнения и вынесение общего множителя). Такая ошибка приводит к неверному ответу, поскольку теряются корни — те значения переменной, при которых указанное выражение обращается в нуль.

Решите уравнение $\cos 2x = \sin^3 x + \cos^3 x$.

Решение. Имеем

$$\cos 2x = \sin^3 x + \cos^3 x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = (\sin x + \cos x) \cdot (\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) - (\sin x + \cos x) \cdot (1 - \sin x \cos x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(\cos x - \sin x - 1 + \sin x \cos x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0, & (1) \\ \cos x - \sin x - 1 + \sin x \cos x = 0. & (2) \end{cases}$$



Решим уравнение (1): $\sin x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi n$,
 $n \in \mathbb{Z}$.

Решим уравнение (2): $\cos x(1 + \sin x) - (1 + \sin x) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (1 + \sin x)(\cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1, \\ \cos x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.



Среди всех однородных уравнений выделяют уравнение второго порядка, которое сводится к квадратному уравнению. В школьной практике встречаются также уравнения третьего порядка, которые сводятся к кубическим уравнениям. Последние решаются, как правило, путем группировки и последующего разложения на множители. Если $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, то однородное уравнение второго порядка имеет вид

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$$

и сводится к квадратному заменой $z = \operatorname{tg} x$ (после деления на $\cos^2 x$) или $z = \operatorname{ctg} x$ (после деления на $\sin^2 x$). Уравнение

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = d$$

сводится к однородному с помощью тождества

$$d = d(\sin^2 x + \cos^2 x)$$





Отдельного замечания заслуживает универсальная тригонометрическая подстановка. Вообще говоря, любое тригонометрическое уравнение вида $f(\sin x; \cos x) = 0$ (f — рациональное алгебраическое выражение) может быть сведено к алгебраическому уравнению относительно новой переменной $z = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ с помощью формул

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$$

(поэтому такая подстановка и называется универсальной). Отметим, что эти формулы не являются тождествами: они справедливы, только если $\cos \frac{x}{2} \neq 0$. Поэтому случай, когда $\cos \frac{x}{2} = 0$, то есть когда $x = \pi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, при решении уравнения этим способом должен быть рассмотрен отдельно. Если такие значения x являются решениями исходного уравнения (это проверяется подстановкой значений $x = \pi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, в данное уравнение), то их также следует включить в ответ. Таким образом, решение уравнений с помощью

универсальной тригонометрической подстановки требует повышенного внимания и осторожности. Кроме того — и это самое главное — довольно трудно придумать уравнение, решение которого возможно только с помощью универсальной тригонометрической подстановки. Другие способы, как правило, оказываются более эффективными и короткими. Поэтому рекомендовать использование универсальной тригонометрической подстановки в качестве метода решения уравнений можно лишь со значительными оговорками.



Ключевым признаком задачи 13 является *необходимость отбора* полученных в результате решения того или иного уравнения корней в соответствии с вытекающими из условия ограничениями.

При этом для решения задачи 13 необходимо уверенное владение навыками решения всех типов уравнений и систем уравнений, изучаемых в основной и старшей школе.



Методы отбора корней тригонометрических уравнений

Арифметический

Алгебраический

Функционально-графический

*Геометрический (на тригонометрической окружности
или на числовой прямой)*



Алгебраический метод отбора корней удобен в тех случаях, когда:

- последовательный перебор значений параметров приводит к вычислительным трудностям;
- промежуток для отбора корней большой;
- значения обратных тригонометрических функций, входящих в серии решений, не являются табличными;
- при решении задач с дополнительными условиями.

Алгебраический метод – это:

- а) решение неравенства относительно целочисленного параметра и вычисление корней;
- б) исследование уравнения с двумя целочисленными параметрами




Геометрический способ отбора корней предполагает наличие у учащихся навыков изображения решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств на числовой окружности или прямой, поэтому необходимо напомнить им основные действия с точками числовой окружности, связанные с формулами решений простейших тригонометрических уравнений. Геометрический способ предполагает:

- а) изображение корней на тригонометрической окружности и их отбор с учетом имеющихся ограничений;
- б) изображение корней на числовой прямой с последующим отбором и учетом имеющихся ограничений.

Функционально-графический метод:

отбор корней с использованием графиков простейших тригонометрических функций.

При этом подходе требуется умение схематичного построения графика тригонометрической функции и применение формул корней соответствующих уравнений.



Отбор корней методом перебора

Решите уравнение $\sqrt{x+2-x^2}(\sqrt{3}\sin x + \cos x) = 0$.

Решение

1. Преобразуем уравнение к совокупности и решим отдельные уравнения и неравенство:

$$\sqrt{x+2-x^2}(\sqrt{3}\sin x + \cos x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+2-x^2 = 0 \\ x+2-x^2 \geq 0 \\ \sqrt{3}\sin x + \cos x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \\ (x+1)(x-2) \leq 0 \\ \operatorname{tg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \\ -1 \leq x \leq 2 \\ x = -\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

2. Решение системы $\begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ x = -\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ будем искать методом перебора k :

- $k = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6}$, так как $-1 < -\frac{\pi}{6} < 0$, то $x = -\frac{\pi}{6} \in [-1; 2]$.
- $k = 1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}$, так как $\frac{5\pi}{6} > \frac{5 \cdot 3}{6} > 2$, то $x = \frac{5\pi}{6} \notin [-1; 2]$.
- Очевидно, что для последующих значений $k > 1$ также $x \notin [-1; 2]$.
- $k = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{7\pi}{6}$, так как $-\frac{7\pi}{6} < -\frac{7 \cdot 3}{6} - 1$, то $x = -\frac{7\pi}{6} \notin [-1; 2]$.
- Очевидно, что для последующих значений $k < -1$ также $x \notin [-1; 2]$.

3. В **ответ** объединим найденные корни: $-1; 2; -\frac{\pi}{6}$.

Отбор корней на основе решения неравенства

Найдите все корни уравнения $2\ln(-\sqrt{2} \sin x) = \ln(5 \sin x + 3)$, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{7}; \frac{33\pi}{14}\right]$.

Решение

1. Преобразуем уравнение:

$$2\ln(-\sqrt{2} \sin x) = \ln(5 \sin x + 3) \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{2} \sin x > 0 \\ (-\sqrt{2} \sin x)^2 = 5 \sin x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x < 0 \\ 2\sin^2 x - 5 \sin x - 3 = 0 \end{cases}$$

2. Сделаем замену $t = \sin x$ и найдем корни квадратного уравнения:

$$\begin{cases} -1 \leq t < 0 \\ 2t^2 - 5t - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq t < 0 \\ \begin{cases} t = 3 \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2}$$

3. Найдем корни исходного уравнения:

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

4. Для каждой серии корней, выберем те из них, которые принадлежат отрезку $\left[-\frac{5\pi}{7}; \frac{33\pi}{14}\right]$. Для этого решим неравенства:

$$-\frac{5\pi}{7} \leq -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \leq \frac{33\pi}{14}$$

$$-30 \leq -7 + 84k \leq 99$$

$$-23 \leq 84k \leq 106$$

$$-\frac{23}{84} \leq k \leq \frac{106}{84} \Rightarrow k = 0; 1$$

$$-\frac{5\pi}{7} \leq -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \leq \frac{33\pi}{14}$$

$$-30 \leq -35 + 84n \leq 99$$

$$4 \leq 84n \leq 134$$

$$\frac{4}{84} \leq n \leq \frac{134}{84} \Rightarrow n = 1$$

4. Запишем **ответ**: $-\frac{\pi}{6}; -\frac{11\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}$.

Отбор корней на отрезке при помощи окружности

Найдите все корни уравнения $\frac{1}{\cos^2 x} + 2 = 4 \operatorname{tg} x$, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right]$.

Решение

1. Преобразуем уравнение и найдем его корни:


$$\frac{\overbrace{\operatorname{tg}^2 x + 1}^1}{\cos^2 x} + 2 = 4 \operatorname{tg} x \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x + 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = 1 \\ \operatorname{tg} x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

2. Изобразим на окружности корни и диапазон $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right]$.

3. Запишем в **ответ** корни, попавшие в отрезок:

$$-\frac{3\pi}{4}, \operatorname{arctg} 3 - \pi, \frac{\pi}{4}.$$



Чаще всего выпускники выбирают способы отбора корней либо с помощью тригонометра, либо с помощью двойного неравенства, либо с помощью перебора.

Какой способ отбора корней лучше — с помощью тригонометрического круга или с помощью двойного неравенства? У каждого из них есть «плюсы» и «минусы».

Пользуясь тригонометрическим кругом, вы не ошибетесь. Вы видите и интервал, и сами серии решений. Это наглядный способ.

Зато, если интервал больше, чем один круг, удобнее отбирать корни с помощью двойного неравенства.

Например, надо найти корни из серии $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in Z$ на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; 20\pi]$. Это больше 10 кругов! Конечно, в таком случае лучше решить двойное неравенство.

При отборе корней с помощью перебора значений целочисленной постоянной в формуле корней необходимо проверить, что меньшие и большие значения этой постоянной дают решения, не попадающие в требуемый промежуток.

Отбор корней на графике

Найдите корни уравнения $\frac{2 \sin 2x + 2\sqrt{2} \sin x - (2 \cos x + \sqrt{2})}{\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2}} = 0$.

Решение


1. Преобразуем уравнение и найдем нули числителя:

$$2 \cdot 2 \sin x \cos x$$

$$\frac{2 \sin 2x + 2\sqrt{2} \sin x - (2 \cos x + \sqrt{2})}{\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{2 \sin x (2 \cos x + \sqrt{2}) - (2 \cos x + \sqrt{2})}{\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin x - 1 = 0 \\ 2 \cos x + \sqrt{2} = 0 \\ 2 \cos x - \sqrt{2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \\ \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \bullet \\ x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad \bullet \\ \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right.$$



2. Изобразим графики функций $y = \cos x$ и $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ на отрезке $[-\pi; \pi]$, который является периодом уравнения.

3. Отметим на оси абсцисс полученные корни числителя, а также интервал $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$, где $\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. На отрезке $[-\pi; \pi]$ в интервал $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$ попал только корень $x = \frac{\pi}{6}$.

5. Запишем полученный корень в ответ, прибавив период: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi t, t \in \mathbb{Z}$.

Основные ошибки задания 13

- переход к записи не совокупности, а системы двух уравнений после разложения на множители,

$$\sin x (4 \sin^2 x - 4\sqrt{3} \sin x + 3) = 0$$

1) $\sin x = 0$

$$\begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = 2\frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

2) $4 \sin^2 x - 4\sqrt{3} \sin x + 3 = 0$

Замена: $\sin x = t$

$$4t^2 - 4\sqrt{3}t + 3 = 0$$
$$D = 16 \cdot 3 - 4 \cdot 4 \cdot 3 = 0.$$
$$t = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

или

Обратная замена:

$$\begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Основные ошибки задания 13

- необоснованный отбор корней в пункте б): например, выполняя отбор корней на тригонометрической окружности выпускники не показывали на рисунке либо границы отрезка, либо названия «нужных точек». Или, выполняя отбор подстановкой вместо n целых значений, перебор начинали и останавливали только на корнях, принадлежащих отрезку:

$$x_2 = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$

1) $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 $k = -2, x = -2\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$
 $k = -3; x = -3\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$


2) $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $n = -1, x = \frac{\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi - 8\pi}{4} = \frac{-7\pi}{4} \notin \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$
 $n = -2, x = \frac{\pi}{4} - 4\pi = \frac{\pi - 16\pi}{4} = \frac{-15\pi}{4} \notin \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$

3) $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 $n = -2, x = \frac{3\pi}{4} - 4\pi = \frac{3\pi - 16\pi}{4} = \frac{-13\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; -2\pi\right]$

Ответ: а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 $\pi k, k \in \mathbb{Z}.$
б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi.$

Основные ошибки задания 13

незнание формул решений простейших уравнений, ошибки в преобразовании выражений, неумение правильно найти нужное значение аркфункции.

$$\begin{aligned} \text{а) } & 4\cos^3 x + 4\sqrt{3}\sin^2 x + 3\cos x = 4\sqrt{3} \\ & 4\cos^3 x + 4\sqrt{3}(1 - \cos^2 x) + 3\cos x - 4\sqrt{3} = 0 \\ & 4\cos^3 x + (1 - \cos^2 x) + 3\cos x = 0 \\ & 4\cos^3 x + 1 - \cos^2 x + 3\cos x = 0 \\ & \cancel{4\cos^3 x} + \cos x(4\cos^2 x + 1 - \cos x + 3) = 0 \\ \cos x = 0 & \quad \text{или} \quad 4\cos^2 x + 1 - \cos x + 3 = 0 \\ x = \pi n, n \in \mathbb{Z} & \quad \cos x(4\cos x + 1 - 3) = 0 \\ & 4\cos x + 1 - 3 = 0 \\ & 4\cos x = -2 \quad \text{или} \quad \cos x = 0 \\ & \cos x = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ & \cos x = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad \dots \\ & x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$


Все еще встречается такая ошибка, как неумение работать с иррациональными числовыми выражениями. В связи с этим, для многих учащихся решение квадратного уравнения с иррациональными коэффициентами представляло трудность (чаще всего решение не доводится до конца).

$$-6 \sin^2 x + 5\sqrt{2} \sin x + 8 = 0$$

Замена: $\sin x = t$

$$-6t^2 + 5\sqrt{2}t + 8 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (5\sqrt{2})^2 - 4 \cdot (-6) \cdot 8 = 50 + 192 = 242.$$

$$t_{1/2} = t_1 = \frac{-5\sqrt{2} + \sqrt{242}}{-12}$$

$$t_2 = \frac{-5\sqrt{2} - \sqrt{242}}{-12}$$

Советы учащимся

1. Помним про область допустимых значений уравнения!

Если в уравнении есть дроби, корни, логарифмы или арксинусы с арккосинусами – сразу записываем ОДЗ. А найдя корни, проверяем, входят они в эту область или нет.

Если в уравнении есть $\operatorname{tg} X$ – помним, что он существует, только если $\operatorname{COS} X$ не равен нулю.

2. Замена переменной.

Если есть возможность сделать замену переменной – делаем замену переменной! От этого уравнение сразу станет проще.

3. Тригонометрические формулы.

Если еще не выучили формулы тригонометрии – пора это сделать! Много формул не нужно. Самое главное – тригонометрический круг, формулы синусов и косинусов двойных углов, синусов и косинусов суммы (разности), понижения степени. Формулы приведения не надо зубрить наизусть! Надо знать, как они получаются.

Советы учащимся

4. Как отбирать решения с помощью тригонометрического круга?

Вспомним, что крайняя правая точка тригонометрического круга соответствует числам -4π , -2π , 0 , 2π , 4π ... Дальше всё просто. Смотрим, какая из точек этого типа попадает в указанный в условии промежуток. И к ней прибавляем (или вычитаем) нужные значения.

Например, вы нашли серию решений $x = \pi/3 + 2\pi n$, где n – целое, а найти надо корни на отрезке $[5\pi/2; 9\pi/2]$. На указанном промежутке лежит точка 4π . От нее и будем отсчитывать. Получим: $x = 4\pi + \pi/3 = 13\pi/3$.

5. Проверить ответ.

Получив ответ, проверьте его правильность. Просто подставьте в исходное уравнение! Задача 13 – несложная, и за нее надо и можно получить 2 полных балла.